

Selectief herbicide ter bestrijding van éénjarige onkruiden in na-opkomst in de bietenteelt

BETASANA® TRIO SE
TOELATINGSNUMMER : 14293 N
FORMULERING : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC)
WERKZAME STOFFEN : DESMEDIFAM, ETHOFUMESAAT EN FENMEDIFAM
GEHALTEN : RESP. 15 G/L, 115 G/L EN 75 G/L
AARD WERKING : HERBICIDE

Professioneel gebruik

GEVARENAANDUIDINGEN

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P273 Voorkom lozing in het milieu.
 P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.
 SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



WAARSCHUWING

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door:

UPL Benelux BV
 Claudius Prinsenlaan 144a
 4818 CP Breda
 085 - 0712300

Toelatingshouder

UPL Europe Ltd.
 The Centre, Birchwood Park
 Warrington, Cheshire
 WA3 6YN, United Kingdom



® gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.

CHARGENUMMER:
 Zie elders op de verpakking

010618

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in het volgende toepassingsgebied (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Miniumum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 – 2,5 l/ha	3	7 l/ha	5
		1-1.4 l/ha*	7		

*In LDS toepassing

Toepassingsvoorwaarden

Betasana Trio SE dient te worden toegepast in 100-300 liter water per ha.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen

AANBEVELINGEN

Algemeen

Betasana Trio SE is een herbicide voor toepassing na opkomst van de bieten. Het geeft een goede bestrijding van de meeste éénjarige breedbladige onkruiden.

Toepassingen

Gebruik gedurende de teelt in totaal niet meer dan 7 l/ha Betasana Trio SE. Met de onkruidbestrijding dient begonnen te worden op klein net gekiemd onkruid, in de regel is dit bij opkomst van de bieten. Volgbesputtingen zullen noodzakelijk zijn wanneer nieuwe onkruiden kiemen. Toe te passen volgens het klassieke of volgens LDS systeem.

Dosering:

Klassiek systeem:

2,0 – 2,5 l/ha Betasana Trio SE op onkruiden vanaf het kiemblad-stadium tot het twee-blad-stadium. Maximaal 3 toepassingen per teeltcyclus.

Bij afgeharde onkruiden kan de toevoeging van 0,5 l/ha minerale of plantaardige olie het bestrijdingsresultaat verbeteren.

LDS systeem:

1-1.4 l/ha Betasana Trio SE in LDS systeem op onkruiden in het kiemblad-stadium. Onder droge omstandigheden kan 0.5 l/ha olie worden toegevoegd. Deze toepassing bij nieuwe onkruidgolven telkens herhalen waarbij een minimaal interval van 5 dagen gerespecteerd dient te worden.

Restricties

Spuit op een droog en gezond bietengewas.

Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.

Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten.

Spuitvoorschriften

Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur.

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Na de eerste spoeling eventueel contactlenzen verwijderen en doorgaan met spoelen gedurende minstens 15 minuten. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water afwassen; alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inslikken Mond spoelen met water. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Inademing In de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM.

NOTA

Voor schade voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.