

CORZAL® SE

W4

TOELATINGSNUMMER : 13234 N
FORMULERING : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC)
AARD WERKING : HERBICIDE
WERKZAME STOF : FENMEDIFAM
GEHALTE : 160 G/L

GEVARENAANDUIDINGEN

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
 P273 Voorkom lozing in het milieu.
 P280 Beschermende handschoenen en oog- of gelaatsbescherming dragen.
 P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

**WAARSCHUWING****Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.**

Verdeeld door:	Toelatingshouder:
UPL Benelux BV	UPL Europe Ltd.
Claudius Prinsenlaan 144A	The Centre, Birchwood Park
4818 CP Breda	Warrington, Cheshire
085 – 071 23 00	WA3 6YN, United Kingdom



® gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking

191018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassing sgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	8 per teeltcyclus	8 l/ha per teeltcyclus	7
			1-1,5 l/ha	8 per teeltcyclus		
			2-2,5 l/ha	4 per teeltcyclus		
	Rijenbehandeling na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25-0,37 l/ha ¹	8 per teeltcyclus		
			0,5-0,75 l/ha	8 per teeltcyclus		
			1-1,25 l/ha	8 per teeltcyclus		
Aardbei (onbedekte teelt)	Voor bloei, na oogst of na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	4-8 l/ha	2 per 12 maanden	8 l/ha per 12 maanden	10

¹ in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de teelt van aardbei, spinazie, snijbiet, gezaaide boomkwekerijgewassen, bloemisterijgewassen, veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen en rode bieten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Voor bloei, na oogst of na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0.5-3 l/ha	12 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	5	-
Spinazie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	5	28
Snijbiet (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	5	28
Boomkwekerijgewassen (gezaaid) (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-3 l/ha	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	5	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-3 l/ha	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	5	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Veredelingen en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. maïs, granen en graszaadteelt, hopen en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-3 l/ha	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	5	-
Rode biet (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	-
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus			

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassing per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclussen			

¹ in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt van aardbei maximaal 8 l/ha per 12 maanden toepassen. In de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen alleen toepassen in het eerste groeiseizoen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Bij het gebruik in bieten, het middel toepassen voor het sluiten van het gewas.

Dit middel bevat de werkzame stof fenmedifam. Fenmedifam behoort tot de fenylcarbamaten. De Hrac code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Algemeen

CORZAL SE is een bladherbicide zonder bodemwerking. Het middel bestrijdt eenjarige breedbladige onkruiden. Bij voorkeur op zeer jonge onkruiden (kiembladstadium) toepassen. Minder gevoelige onkruiden zijn kamille, kleefkruid, varkensgras, perzikkruid, waterpeper en opslagplanten van koolzaad. Grassen en wortelonkruiden worden niet bestreden.

Spuiten bij groeizaam weer en bij voorkeur bij bedekte lucht. CORZAL SE dient verspoten te worden in 200-400 liter water per ha.

Toepassingen

Suiker- en voederbieten

Gebruik gedurende de teelt in totaal niet meer dan 8 liter/ha CORZAL SE. Met de onkruidbestrijding dient begonnen te worden op kiemend onkruid, in de regel is dit bij opkomst van de bieten. Tussen de behandelingen dient een interval van minimaal 7 dagen in acht te worden genomen. CORZAL SE kan worden gemengd met voor deze toepassing toegelaten herbiciden. De toepassing dient na opkomst van de bieten plaats te vinden en kan op diverse manieren uitgevoerd worden:

1. Lage Doseringen Systeem: op onkruiden in het kiembladstadium.

Dosering: 0,5 l/ha CORZAL SE afhankelijk van de te bestrijden onkruiden + 0,5 l/ha metamitron (700 g/l) + 0,5 l/ha ethofumesaat (200 g/l).

Indien gewenst kan 0,5 l/ha olie (voor deze toepassing geschikt) worden toegevoegd. De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn. Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen kunnen de doseringen eventueel verhoogd worden tot 0,75 l/ha.

2. In het twee-blad-stadium van de bieten.

Dosering: 1-1,5 l/ha CORZAL SE. De toepassing zo nodig herhalen in het vier-blad-stadium van de bieten.

3. In het twee-blad-stadium van de bieten wanneer de onkruiden verder ontwikkeld zijn of minder gevoelige onkruiden voorkomen.

Dosering: 2-2,5 l/ha CORZAL SE.

De toepassing zo nodig herhalen in het vier-blad-stadium van de bieten.

Aardbeien in de vollegrond

Toepassen in het vermeerderingsveld: vanaf 14-21 dagen na het uitplanten, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

Toepassen in het productieveld:

- Vanaf 14-21 dagen na het uitplanten (zodra de planten goed zijn aangeslagen) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen.
- Na de oogst.

Dosering: 4-8 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 2 per 12 maanden en maximaal 8 l/ha per 12 maanden (tussen de behandelingen dient een interval van minimaal 10 dagen in acht te worden genomen) of 0,5-3 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 12 per teeltcyclus en maximaal 6 l/ha per teeltcyclus (tussen de behandelingen dient een interval van minimaal 5 dagen in acht te worden genomen).

Niet toepassen in combinatie met andere middelen; minimaal 3 dagen tussen de toepassing van CORZAL SE en van andere middelen in acht nemen.

Spinazie (onbedekte teelt)

Toepassen na opkomst. De toepassing kan enige gewasschade en opbrengstderving veroorzaken.

Tussen de behandelingen dient een interval van minimaal 5 dagen in acht te worden genomen.

Dosering: 1-2 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 2 per teeltcyclus en maximaal 2 l/ha per teeltcyclus.

Snijbieten (onbedekte teelt)

Toepassen na opkomst. Tussen de behandelingen dient een interval van minimaal 5 dagen in acht te worden genomen.

Dosering: 1-2 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 2 per teeltcyclus en maximaal 2 l/ha per teeltcyclus.

Boomkwekerijgewassen (gezaaid), bloemisterijgewassen en veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)

Toepassen na opkomst. Tussen de behandelingen dient een interval van minimaal 5 dagen in acht te worden genomen.

Dosering: 1-3 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 6 per 12 maanden en maximaal 6 l/ha per 12 maanden.

Rode biet (onbedekte teelt)

Gebruik gedurende de teelt in totaal niet meer dan 6 liter/ha CORZAL SE. Tussen de behandelingen dient een interval van minimaal 7 dagen in acht te worden genomen. De toepassing dient na opkomst van de bieten plaats te vinden en kan op diverse manieren uitgevoerd worden:

1. Lage Doseringen Systeem in combinatie met toegelaten middelen.
Dosering: 0,5-0,75 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 6 per teeltcyclus.
2. Dosering: 1-1,5 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 6 per teeltcyclus.
3. Dosering: 2-2,5 l/ha CORZAL SE met een maximum aantal toepassingen van 3 per teeltcyclus.

Restricties

Spuit op een afgehard, droog en gezond bietengewas.
Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten.

Spuitvoorschriften

Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur.
Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inslikken Mond spoelen met water. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Inademing In de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.