



# CENTURION PLUS®

HERBICIDE



**In de handel gebracht door:**

UPL Benelux BV, Claudius Prinsenlaan 144A,  
4818 CP Breda, 085-0712300

NL 6200003

**INHOUD: 5L**  
**CLETHODIM 120 G/L**

NL-CD1-194-02 (0121)

NL 2641229/02-0121



**Vorstvrij, koel en droog bewaren.****Beschrijving van de eerste hulp maatregelen:**

**Algemeen advies:** Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

**Na inademing:** Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

**Na contact met huid:** Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.

**Na contact met de ogen:** Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.

**Na inslikken:** De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling of behandeling na uitplanten in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2,5 L/ha	-	56
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2,5 L/ha				
Bieten	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,5 L/ha**	2	2,5 L/ha	7	56
	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek	1 L/ha	1		-	
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2,5 L/ha				
Winterkoolzaad	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 L/ha	1	1 L/ha	-	120
Boon met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-	30
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-	30
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	28
	Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha				
Wortelen (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	48
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha				
Zaaiui (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha				
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha				
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha				
Sjalotten (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha				

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Knoflook (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*				
	Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha				

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\* Dosering afhankelijk van het groeistadium van het onkruid.

\*\* In Lage Dosering Systeem (LDS) in combinatie met toegelaten middelen.

<sup>1</sup> Straatgras (*Poa annua*)

<sup>2</sup> Kweek (*Elytrigia repens*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen incl. sojaboon, karwij (oliehoudende zaden), zonnebloem (oliehoudende zaden), vezelgewassen, lupine (groenbemester), afrikaantjes (groenbesters), witlof (pennenteelt), cichorei, aardbei (vermeerdering, wachtbed en productie), bloemkoolachtigen, pastinaak, knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, rode biet, knolselderij, schorsener, mierikswortel, zilveren en picklers, maggi, engelwortel, bevernelwortel, wortelpeterselie, lelie, iris, dahlia, zantedeschia, hyacint, narcis, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en bij de veredelingsteelt, bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Droog te oogsten erwten	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	56
Droog te oogsten bonen incl. sojaboon	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	56
Karwij (oliehoudende zaden)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	120
Lijnzaad	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	-
Zonnebloem (oliehoudende zaden)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	100
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Vezelgewassen	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Lupine (groenbemester)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Afrikaantjes (groenbesters)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup> en kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2,5 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2,5 L/ha			

Cichorei	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2,5 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2,5 L/ha			
Aardbei vermeerdering en wachtbed (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Aardbei productie (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	30
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	28
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Pastinaak (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Knolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Koolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Aardpeer (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Japane aardappel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Rode biet (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Schorseneer (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	48
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Zilvervui (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			

Picklers (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Maggi (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Engelwortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Bevernelwortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Lelie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,5 L/ha <sup>3</sup>	4 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus		
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*	1 per teeltcyclus		
		Meerjarige grasachtige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus		
Dahlia (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Narcis (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*	1 per teeltcyclus		
		Meerjarige grasachtige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus		
Zantedeschia (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Iris (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Hyacint (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*	1 per teeltcyclus		
		Meerjarige grasachtige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus		
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Boomkwekerijgewassen (grondgebonden, onbedekte teelt)	Voor en na opkomst <sup>4</sup> , rijenbehandeling	Straatgras <sup>1</sup>	2 L/ha	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			
Veredelingsteelt, bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras <sup>1</sup>	1-2 L/ha*			
		Kweek <sup>2</sup>	2 L/ha			

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

\* Dosering afhankelijk van het groeistadium van het onkruid.

<sup>1</sup> Straatgras (*Poa annua*)

<sup>2</sup> Kweek (*Elytrigia repens*)

<sup>3</sup> In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

<sup>4</sup> Toepassen met gebruikmaking van afschermkappen om het gewas niet te raken

#### Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van zonnebloem (oliehoudende zaden), vezelgewassen, lupine (groenbemester), witlof (pennenteelt) en cichorei het middel tegen straatgras toepassen in 150-240 liter water per ha.

In de teelt van droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, sojaboon, pastinaak, knolraap, koolraap, aardpeer, japanse aardappel, rode biet en knolselderij het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.

In de teelt van droog te oogsten erwten alleen toepassen tot BBCH 39 (voor de eerste bloemknoppen zichtbaar zijn).

In de teelt van droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon alleen toepassen tot BBCH 29 (voor de eerste bloemknoppen zichtbaar zijn).

In de teelt van sojaboon, aardpeer en Japanse aardappel en tegen straatgras in zonnebloem alleen toepassen tot BBCH 19 (9 bladeren ontvouwen).

In de teelt van rode biet alleen toepassen tot BBCH 33 (30% bodembedekking door het gewas)

In de teelt van bloemkoolachtigen het middel toepassen voor BBCH 41 (voordat de oogstbare delen (bloemkool of broccoli) worden gevormd).

Behandelde lijnzaad niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Behandelde vezelgewassen niet voor dierlijke consumptie bestemmen.

Toepassing van het middel in karwij is alleen toegestaan voor productie van karwij als oliehoudend zaad (niet als kruidenzaadgewas).

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en terrestrische planten te beschermen is toepassing van het middel met een **dosering groter dan 1 L/ha tot maximaal 2 L/ha**, uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of

- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 225 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of
- een veldspuit met verlaagde spuitboom en luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen met druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 90° en een kantdop van tenminste druppelgrootte M en een spuitdopafstand van 25 cm en spuitdophoogte van maximaal 30 cm, of
- een veldspuit met sleeploeke systeem in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% en een bijbehorende driftarme kantdop bij een spuitdophoogte van maximaal 20 cm, of
- een overkapte beddenspuit in combinatie met spuitdoppen van tenminste druppelgrootte M en een kantdop aan beide kanten van de spuit met tenminste druppelgrootte M, of
- een veldspuit met Hardi Twin Force luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 75% en bijbehorende kantdop van tenminste DRD 75% bij een rijsnelheid van maximaal 12 km/uur.

#### Alleen geldend voor de teelt van uien:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en terrestrische planten te beschermen is toepassing van het middel met een **dosering groter dan 2 L/ha** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van: - een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of

- een veldspuit met verlaagde spuitboom en luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen met druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 90° en een kantdop van tenminste druppelgrootte M en een spuitdopafstand van 25 cm en spuitdophoogte van maximaal 30 cm, of
- een overkapte beddenspuit in combinatie met spuitdoppen van tenminste druppelgrootte M en een kantdop aan beide kanten van de spuit met tenminste druppelgrootte M.

Met name de gewassen maïs en granen zijn zeer gevoelig voor de stof clethodim. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof clethodim. Clethodim behoort tot de Cyclohexanediolen. De HRAC code is A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.



# CENTURION PLUS®

HERBICIDE



**In de handel gebracht door:**

UPL Benelux BV, Claudius Prinsenlaan 144A,  
4818 CP Breda, 085-0712300

NL 6200003

**INHOUD: 5L**  
**CLETHODIM 120 G/L**

NL-CD1-194-02 (0121)

NL 2641229/02-0121



# CENTURION PLUS®

## HERBICIDE

Toelatingsnummer: 14300 N (W.6)

**Toelatingshouder:** In de handel gebracht door:

Arysta LifeScience S.A.S. UPL Benelux BV,  
Route d'Artix - BP 80 Claudius Prinsenlaan 144A,  
F-64150 Noguères 4818 CP Breda,  
Frankrijk 085-0712300

**Aard van het preparaat:** Emulgeerbaar concentraat

**Werkzame stof:** clethodim

**Gehalte:** 120 g/l

**De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het mengsel:** Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% nafaaleen

**Chargennummer, Productiedatum:** Zie opdruk verpakking

**Gevaaraanduidingen**

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen**

P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.  
P331 GEEN braken opwekken.  
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. **GEVAAR**  
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen**

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarstenheid veroorzaken.  
EUH208 Bevat clethodim. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



NL-CDI-193-02 (0121)

NL 6200003

NL 2641228/02-0121

Deze verpakking is bedrijfsafval



www.agrirecover.eu



**INHOUD: 5L**  
**CLETHODIM 120 G/L**